

NUCLEAR MEDICINE

INSTRUCTIONS:

1. Please arrive in Outpatient Registration 30 minutes prior to the APPOINTMENT time.
2. Bring all insurance information and one picture ID (example: driver's license).
3. Bring a list of all medications that you are currently taking.
4. Wear loose fitting clothing.

EXAM REQUIRING PREPARATION:

1. **HIDA** (Hepatobiliary Scan), please do not eat or drink anything including oral medications 4 hours prior to the exam. No pain medication 4 hours prior to exam.
2. **Gastric Emptying**, please do not eat or drink anything including oral medications 8 hours prior to the exam.
3. **Stress Test**, please do not eat or drink anything 4 hours prior to the exam. Avoid caffeine for 12 hours prior to the exam. Medication instructions will be provided by the scheduler when making the appointment.
4. **Thyroid** procedures, please discontinue the following medications prior to your scheduled exam but only after speaking with your physician. NPO 4 hours prior to exam.
 - a. Synthroid (Thyroxine) – discontinue 4 weeks prior to your scheduled exam.
 - b. Cytomel (Triiodothyronine) – discontinue 2 weeks prior to your scheduled exam.
 - c. Amiodarone- discontinue 4 weeks prior to your scheduled exam.
 - d. Methimazole – discontinue 1 week prior to your scheduled exam.
 - e. Tapazol – discontinue 1 week prior to your scheduled exam.
 - f. Felimazole- discontinue 1 week prior to your scheduled exam.
 - g. Thiamazole- discontinue 1 week prior to your scheduled exam.
 - h. Northyx- discontinue 1 week prior to your scheduled exam.
 - i. Iodine containing products – discontinue 1 week prior to your scheduled exam. Iodine containing products include, potassium iodine, kelp, cough syrup, iodine ointments, and betadine.
 - j. Iodine contrast administered during certain exams should be avoided 6 weeks prior to your thyroid exam. (ie. CT, Fluoroscopy, IR and Cath Lab)

MEDICINA NUCLEAR

INSTRUCCIONES:

1. Por favor, llegue al Registro de paciente ambulatorio 30 minutos antes de la hora de la CITA.
2. Traiga consigo toda la información del seguro y una identificación con foto (como la licencia de conducir).
3. Traiga una lista de todos los medicamentos que está tomando actualmente.
4. Use ropa holgada.

PREPARACIÓN NECESARIA PARA EL EXAMEN:

1. **HIDA** (examen hepatobiliar): por favor, no ingiera ni comida ni bebida, ni medicamentos orales durante las 4 horas previas al examen. Sin medicamentos para el dolor 4 horas antes del examen.
2. **Vaciado gástrico:** por favor, no ingiera ni comida ni bebida, ni medicamentos orales durante las 8 horas previas al examen.
3. **Prueba de estrés:** por favor, no ingiera ni comida ni bebida durante las 4 horas previas al examen. Evite la cafeína durante las 12 horas previas al examen. El programador le brindará instrucciones sobre los medicamentos a la hora de concretar la cita.
4. **Procedimientos para la tiroides:** por favor, descontinúe los siguientes medicamentos antes de su examen programado, pero hágalo únicamente después de haber hablado con su médico. N.P.O 4 horas antes del examen.
 - a. Synthroid (tiroxina): descontinúe durante 4 semanas antes del examen programado.
 - b. Cytomel (triyodotironina): descontinúe 2 semanas antes del examen programado.
 - c. Amiodarona: descontinúe 4 semanas antes del examen programado.
 - d. Metimazol: descontinúe 1 semana antes del examen programado.
 - e. Tapazol: descontinúe 1 semana antes del examen programado.
 - f. Felimazole: descontinúe 1 semana antes del examen programado.
 - g. Tiamizol: descontinúe 1 semana antes del examen programado.
 - h. Northyx: descontinúe 1 semana antes del examen programado.
 - i. Productos que contienen yodo: descontinúe 1 semana antes del examen programado. Los productos que contienen yodo incluyen el yodo de potasio, el jarabe para la tos de kelp, ungüentos de yodo y betadine.
 - j. El contraste de yodo administrado durante ciertos exámenes debe evitarse 6 semanas antes de su examen de tiroides. (es decir, CT, fluoroscopia, IR y laboratorio de cateterismo)